

КАФЕДРА ФАКУЛЬТЕТСКОЙ ХИРУРГИИ БГМУ

medfish.ru





Гайнутдинов Фазыл Мингазович

профессор кафедры, д.м.н., 6 этаж, проктология

Субхангулов Зинур Мавлютянович

доцент кафедры, к.м.н., 3В РФ 4 этаж, 2 хирургия

Сендерович Ефим Иосифович

доцент кафедры, к.м.н., 3В РФ
ЖД больница, отделение хирургии





Аитова Лилия Ринатовна

завуч кафедры, доцент, к.м.н., 9 этаж

Мехтиев Намик Муратович

профессор кафедры, д.м.н., 6 этаж

Сакаев Эрнест Маратович

доцент кафедры, к.м.н.,
9 этаж



Гришина Елена Евгеньевна

доцент кафедры, к.м.н.

Ибрагимов Денис Радикович


ассистент, аспирант кафедры


Ирназаров Фагим Ринатович

ассистент, аспирант кафедры

Маннанова Елена Римовна

старший лаборант кафедры





Клиническая база ГБУЗ ГKB № 21 г. Уфы МЗ РБ (главный врач – д.м.н. Нагаев Р.Я.)

Клинические исследования

Работа в отделениях

Внедрение новых методов
диагностики и лечения

Проведение семинаров с врачами

Организация учебного зала
(трансляция с операционной,
тренажеры, банк операций,
требуется фиксацию интересных
случаев, выход в интернет, участие в
видеошколах, интерактивных
семинарах).



Приемное отделение в 1989 и 2014 гг.



Отделения – 1 (абдоминальная 9 эт.), 2 (гнойная, экстренная, эндокринная 4 эт.) хирургии, проктология 6 эт., сосудистая (микрохирургия, пластическая 2 эт.).



Эндоскопия, ФД, Рентгенхирургическое



Наружная грыжа



Внутренняя грыжа



Выпадение (prolapsus)
(Курс колопроктологии)



Эвентрация

ЧАСТОТА ГРЫЖ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА




medfish.ru

Наибольшее число грыж наблюдается в раннем детском возрасте (врожденные), в трудоспособном возрасте (30-40 лет а также в старческом возрасте)

Увеличение количества больных с грыжами

ОПЕРАЦИИ В ЭКСТРЕННОМ ПОРЯДКЕ ПО ПОВОДУ ОСЛОЖНЕНИЙ

□ В Республике Башкортостан в 2012 году было доставлено в стационары 1108 пациентов и прооперировано 1106 с ущемленными грыжами (в 2011 г. – 1127, 2012 - 1329), а в 1972 г. – только 596. Соотношение плановых и экстренных грыжесечений составляло в 1972 г. 7:1, в 2012 г. – упало до 4:1, в 2016 – 6:1.



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА



➤ Первое письменное упоминание о грыже живота отделено от нас более чем тремя с половиной тысячами лет (около 1552 лет до н.э.).

➤ Сведения о грыжах встречаются в работах Гиппократ (V в. до н.э.), Цельса (I в. н.э.), Гелиодора (IV в. н.э.), Орибазнуса (V в. н.э.).

➤ Термин «грыжа» впервые был введен выдающимся врачом древности Клавдием Галеном (129-199 гг. н.э.).

➤ Ему же принадлежит и концепция происхождения грыжи.

ИСТОРИЧЕС- КАЯ СПРАВКА



Успехи хирургии грыж связаны с развитием асептики, антисептики и способов обезболивания.

Основной принцип успешного выполнения герниопластики – послойного, однородного сшивания тканей был разработан и внедрен (1890) Эдуардо Бассини (1844-1919).

воссоздание задней стенки пахового канала – ключ у успеху!

Данный принцип и сейчас является доминирующим в хирургии грыж.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ, ПУПОЧНЫЕ ГРЫЖИ

Le Torre (1897) – «есть столько грыж, сколько оперированных больных».

Maydl (1896) - предложил закрывать грыжевые ворота лоскутами апоневроза.

П.И.Дьяконов (1898), Мейо (1898) предложили создавать дубликатуры брюшной стенки в поперечном направлении. К.М. Сапежко (1898) впервые устранил дефект передней брюшной стенки удвоением мышечно-апоневротического слоя в продольном направлении.



Dr. Edward Earle Shouldice



medfish.ru


(1890 – 1965)

- Founder of the Shouldice Hospital in Ontario, Canada & of the unique Shouldice method for repair of inguinal hernias.



in 1945 y.


1939 *Can Med Assoc J*
41: 112-115



НЕНАТЯЖНАЯ ПЛАСТИКА ПРИНЦИП «ЗАПЛАТКИ»

Zagdoun J. (1959)

нейлоновые сетки на 175
пациентах



Паховая герниопластика по И.Г.Туровцу (1965)

Лапароскопические способы лечения грыж

medfish.ru

- ❑ 1979 R. Ger (лапароскопическое ушивание внутреннего пахового кольца эндостеплером)
- ❑ 1990 R. Schultz (лапароскопическая протезирующая герниопластика)

- 1993 R. Fitzgibbons (лапароскопическая предбрюшинная протезирующая герниопластика)
- 1993 J. Mc.Kernan (ЭВХ экстраперитонеальная протезирующая герниопластика)




Поиск идеального материала продолжается...

medfish.ru

«If it would be possible to produce artificial tissue showing the properties of human fascia or tendon, we would have decided the secret of radical hernia repair»


«Если можно было бы производить искусственные ткани, идентичные свойствам человеческой фасции или сухожилия, мы бы решили тайну радикального лечения грыжи»

Theodor Bilhrot, 1878




**Грыжевые
ворота**

medfish.ru



**Грыжевой
мешок**

(шейка, тело, верхушка)




**Грыжевое
содержимое**

ГРЫЖЕВЫЕ ВОРОТА

medfish.ru

- Вид, в зависимости от тканей, формирующих ворота - апоневротические, мышечные, мышечно-апоневротические (паховый канал), костно-мышечно-апоневротические (запирательный канал, седалищные грыжи).
- Форма грыжевых ворот - овальная, круглая, щелевидная, треугольная или неопределенная.
- Размеры грыжевых ворот - от нескольких сантиметров в диаметре (пупочные грыжи и белой линии живота) до 20-30 см и более (послеоперационные грыжи и диастаз прямых мышц живота).
- Грыжевые ворота локализуются в "слабых местах" - естественных анатомических образованиях (паховые ямки, пупочное, бедренное кольца, треугольник Пети, промежуток Грюнфельда-Лесгафта и др.) либо могут возникать вследствие различных патологических состояний.



ГРЫЖЕВОЙ МЕШОК

medfish.ru

- ❑ Одно- и многокамерный
- ❑ Овальная или грушевидная форма.
- ❑ Снаружи рыхло прилежат подкожная клетчатка, оболочки семенного канатика и другие образования.
- ❑ Размеры различные
- ❑ Кнутри к стенкам могут припаиваться внутренние органы, что может быть причиной различных осложнений.



СКОЛЬЗЯЩИЕ ГРЫЖИ

Если одной из стенок мешка является полый орган (мочевой пузырь, слепая кишка и другие отделы толстого кишечника, т.е. органы, частично покрытые брюшиной). Клинически - присоединение клиники заболеваний заинтересованных органов. Мочевой пузырь - боли над лоном, учащенное мочеиспускание, рези в мочеиспускательном канале, исчезающие после вправления грыжи. У пожилых больных нередко ~~наблюдается задержка мочи~~. Толстая кишка - боли и вздутие живота, запоры.

- ❑ Опасность во время операции - при вскрытии грыжевого мешка можем повредить полый орган, что закончится наложением кишечной стомы при повреждении толстой кишки или ушиванием мочевого пузыря.

