



**Дивертикулярная
болезнь ободочной
кишки.**


Долихоколон.


Дивертикулез




Причины


- Нарушение моторно-эвакуаторной функции ободочной кишки (повышение внутрипросветного давления)
- Дистрофические изменения в мышечной стенке
- Врожденная или приобретенная слабость соединительной ткани.






TRUE/FALSE







Capsular endoscopy

Дивертикулы сигмы Прибыльская Надежда Андреевна



IntroMedic®

2014-01-10_07:35:58

После 0:19:35 / 2:07:17

поиска




X-ray with barium enema




T-scan with 3D reconstruction






Diverticulitis






Одномоментная операция



Двухэтапная операция.



Долихоколон – удлинение всей ободочной кишки или одного из ее отделов представляет собой самую частую аномалию развития толстой кишки.


Анатомическая классификация.

1. Долихосигма
2. Левосторонний долихоколон
3. Долихотрансверзум
4. Правосторонний долихоколон
5. Субтотальный долихоколон
6. Тотальный долихоколон

Клиническая классификация.

1. Долихоколон без клинических проявлений (бессимптомный долихоколон);
2. Долихоколон с нарушением транзита по толстой кишке;
3. Осложненный долихоколон.

Долихоколон




Долихоколон



Изменение стиля жизни и питания




Использование препаратов,
увеличивающих объем каловых масс




Использование осмотических
слабительных, прокинетиков,
очистительных клизм

Показанием к хирургическому вмешательству является неэффективность консервативной терапии при выраженном нарушении качества жизни.

Хирургическое лечение долихоколон подразумевает резекцию толстой кишки в объеме субтотальной резекции или колэктомии с формированием илеоректального анастомоза





Спасибо за внимание